

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Леонид

Возраст: 29

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.02.2021 10:35:41

формирования заключения врача: 14.02.2021 16:50:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/307584/answer/307590>



Заключение врача

Здравствуйте! Механизм действия алпростатида и ингибиторов ФДЭ-5 не тождественны. Хотя в первом приближении тест с ИФДЭ-5 можно использовать. Но надо помнить, что при использовании ИФДЭ-5 необходима сексуальная стимуляция. Т.е. необходимо создать определённые условия в УЗИ -кабинете и зарезервировать как минимум двойное время на исследование. В принципе это возможно, но требует индивидуальной договорённости. Очевидно, в поисковике необходимо ввести необходимые пожелания и прозвонить клиники. Что касается определённого врача - можно отметить, что любой врач, выполняющий УЗИ половых органов и сосудистые исследования "на потоке" - Вам подходит. В связи с основной жалобой- деформацией полового члена, можно рекомендовать комплекс Пейрофлекс, курсовой приём которого способствует замедлению прогрессирования искривления полового члена и профилактике развития болезни Пейрони после травматичного полового акта или после травмы полового члена. Удачи!