

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Леонид

**Возраст:** 29

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.02.2021 10:43:14

**формирования заключения врача:** 14.02.2021 16:52:34

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/307585/answer/307591>



## Заключение врача

Здравствуйте! Механизм действия алпростатида и ингибиторов ФДЭ-5 не тождественны. Хотя в первом приближении тест с ИФДЭ-5 можно использовать. Но надо помнить, что при использовании ИФДЭ-5 необходима сексуальная стимуляция. Т.е. необходимо создать определённые условия в УЗИ -кабинете и зарезервировать как минимум двойное время на исследование. В принципе это возможно, но требует индивидуальной договорённости. Очевидно, в поисковике необходимо ввести необходимые пожелания и прозвонить клиники. Что касается определённого врача - можно отметить, что любой врач, выполняющий УЗИ половых органов и сосудистые исследования "на потоке" - Вам подходит. В связи с основной жалобой- деформацией полового члена, можно рекомендовать комплекс Пейрофлекс, курсовой приём которого способствует замедлению прогрессирования искривления полового члена и профилактике развития болезни Пейрони после травматичного полового акта или после травмы полового члена. Удачи!