

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 25

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2021 00:34:08

формирования заключения врача: 20.02.2021 17:02:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/307614/answer/307628>



Заключение врача

Здравствуйте! Судя по Вашим жалобам, можно предположить так называемую венозную утечку. Считается, что пациенты с нормальной пиковой скоростью кровотока но неполным эректильным ответом имеют веноокклюзивную дисфункцию. Надо помнить, что доплерография неспецифична в отношении венозной утечки в присутствии артериальной недостаточности. И неполная релаксация гладкой мускулатуры из-за стресса может привести к стёртым результатам. Есть несколько способов справиться с венозной утечкой. Чаще всего применяется констрикционное кольцо, размещаемое на основании пениса. Это приводит к сдавлению субтуникальных вен и препятствует оттоку венозной крови. Кроме того, усиление притока крови по кавернозным артериям позволяет компенсировать венозную утечку. Этого можно добиться с помощью вазодилатирующих препаратов (ингибиторов фосфодиэстеразы-5) и инъекционной терапии. Операции, такие как лигирование дорсальной вены пениса, утратили популярность из-за умеренной результативности и возможности развития осложнений. Удачи!