

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Денис

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.06.2022 14:10:06

формирования заключения врача: 23.06.2022 11:13:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/311175/answer/311184>



Заключение врача

Здравствуйте. Я согласен с назначениями врача. болезнь Пейрони имеет 2 фазы: активную и стабильную. Активная фаза, в ходе которой болезнь развивается длится обычно 8-14 месяцев. В ходе активной фазы как раз и показаны все нехирургические методы лечения (таблетки, УВТ, физиотерапия и пр.). Если у вас нет возможности попасть на УВТ к вашему врачу, то вы можете пройти эту процедуру в другой клинике. Метод операции в стабильную фазу выбирается исходя из разных параметров (длина полового члена, степень искривления, эректильная функция). В НИИ урологии замещение фиброзной бляшки белочной оболочки полового члена лоскутом аутоvene стоит 60 тыс. рублей. Это без стоимости пребывания в палате.