

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 69

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.03.2008 20:36:24

**формирования заключения врача:** 23.03.2008 18:04:44

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/31153/answer/31154>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! Нет, конечно, на основании только лишь малого количества спермы, такие выводы делать преждевременно. Надо хотя бы убедиться в этом. На мой взгляд, Вам надо выполнить постэякуляторный анализ мочи (т. к. анализ мочи после полового акта) - убедиться в том, что сперматозоиды не забрасываются ретроградным током в мочевой пузырь. Далее, сдать кровь на тестостерон и PSA, УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки, семенных пузырьков). И конечно, спермограмму, ее малое количество (2 мл) - не препятствие для подробного анализа. С уважением.