

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Саша

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.04.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 17.04.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/3140/answer/3141>



## Заключение врача

Уважаемый Саша! Вам нужен непосредственный осмотр уролога. Делов том, что врожденное искривление полового члена может встречаться при гипоспадии. Гипоспадия заключается в укорочении дистального (конечного) отдела мочеиспускательного канала. Это приводит к искривлению тела полового члена вниз, которое резко увеличивается при эрекции. В дальнейшем это приводит к невозможности вести нормальную половую жизнь. Лечение этой патологии оперативное, возможно, в несколько этапов. Необходимость операции определяет врач уролог после тщательного осмотра и обследования. Вам, Саша, следует показаться урологу по месту жительства для решения всех этих вопросов. Удачи! [Шадёркин И.А.](#)