

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Артём

**Возраст:** 28

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.04.2024 13:18:27

**формирования заключения врача:** 15.04.2024 16:02:17

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/315715/answer/315717>



## Заключение врача

Здравствуйте, Артём! Существует несколько способов измерения длины полового члена, и они могут немного отличаться в зависимости от цели измерения. 1. Измерение от лобковой кости - этот метод предполагает измерение от лобковой кости до кончика пениса. При этом методе нажимают линейку или измерительную ленту в лобковую кость, что может включать жировую прослойку. Это измерение часто используется в медицинских исследованиях, так как оно обеспечивает более стандартизированную оценку длины. 2. Измерение от основания члена на теле - при этом способе измерения линейка или измерительная лента прикладывается к тому месту, где основание члена встречается с телом, без вдавливания в жировую прослойку. Этот метод может дать меньшее значение по сравнению с первым, особенно если есть заметная жировая прослойка. Оба метода считаются корректными, но результаты могут отличаться. Если Вы хотите получить наиболее точные данные для себя или для медицинских целей, лучше всего использовать измерение от лобковой кости, так как оно минимизирует влияние различий в толщине жировой прослойки. В любом случае важно производить измерение при полной эрекции для более точных результатов. Также стоит отметить, что статистической коррекции размера полового члена в состоянии эрекции, зависящей от роста человека, как правило, не существует.