

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Артём

**Возраст:** 28

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 11.05.2024 09:56:55

**формирования заключения врача:** 12.05.2024 20:00:48

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/315880/answer/315888>



## Заключение врача

Гипоплазия яичек, которая была у Вас диагностирована, теоретически может влиять на репродуктивную функцию и уровни половых гормонов, что, в свою очередь, может влиять на либидо, половое влечение, а также на эрекцию и потенцию. У Вас гипоплазия сопровождается измененными размерами яичек, что может привести к снижению производства тестостерона. Однако Ваш общий уровень тестостерона находится в верхней границе нормы, что говорит о том, что организм все еще способен поддерживать достаточный уровень этого гормона. Отсутствие либидо и проблемы с эрекцией, несмотря на нормальные или повышенные уровни тестостерона, могут быть вызваны другими факторами, включая психологические (стресс, тревожность), физиологические (неврологические или сосудистые проблемы) или даже побочными эффектами лекарств. Вам важно обсудить ваши симптомы и результаты обследования с урологом или андрологом на очном приеме, который может предложить подходящее лечение. Могут быть рекомендованы дополнительные обследования и психологическая помощь. Что касается возможности жить нормальной половой жизнью, то многие мужчины с подобными проблемами находят способы адаптировать и улучшить свою сексуальную функцию с помощью медицинской и психологической поддержки.