

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артем

Возраст: 20

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.05.2024 19:04:53

формирования заключения врача: 29.05.2024 14:02:21

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/315964/answer/315965>



Заключение врача

Здравствуйте! Если судить по данным фотографии, то у Вас все нормально и "отвисания" мошонки нет. Обилие разнообразных жалоб может указывать на психологический характер Вашего состояния, а не на органические заболевания и не требуется урологической помощи. Если подходить формально к Вашим беспокойствам, то можно сказать следующее. Учитывая описанные симптомы — потерю чувствительности полового члена, отсутствие утренних эрекций, сложности с достижением эрекции и обвисание мошонки, возможно, следует рассмотреть несколько возможных причин: 1. Гормональные нарушения: Уровень тестостерона играет важную роль в половом влечении и эректильной функции. Рекомендуется проверить уровень тестостерона и других гормонов. 2. Неврологические проблемы: Повреждение нервов, которые контролируют эрекцию, также может быть причиной. Это может быть связано с травмой, диабетом или другими заболеваниями. 3. Психологические факторы: Стресс, депрессия и другие психологические проблемы могут значительно влиять на сексуальное здоровье. 4. Медикаменты: Некоторые лекарства могут иметь побочные эффекты, влияющие на сексуальную функцию. Обвисание мошонки может происходить из-за возрастных изменений, но в Вашем возрасте это не очень характерно. Это может быть связано с ослаблением мышц мошонки или гормональными изменениями. Что делать дальше: 1. Обратитесь к урологу на очном приеме: Он осмотрит Вас и может рекомендовать провести обследования 2. Сдайте анализы: Общий тестостерон, ГЛ, ФСГ, общий анализ крови, УЗИ мошонки, полового члена, простаты. 3. Обратитесь к эндокринологу: Если будут выявлены гормональные нарушения. 4. Обратитесь к психологу: Если будут выявлены психологические факторы.