

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.06.2024 12:08:51

формирования заключения врача: 08.06.2024 20:24:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316037/answer/316039>



Заключение врача

Это может быть признаком баланопостита. Баланопостит — это воспаление головки полового члена (баланит) и внутреннего листка крайней плоти (постит). Это заболевание может затронуть мужчин любого возраста. Причины: 1. Инфекции: - Бактериальные инфекции (например, стафилококки, стрептококки). - Грибковые инфекции (например, Candida). - Вирусные инфекции (например, герпес). 2. Недостаточная гигиена: накопление смегмы (секрет желез крайней плоти) может способствовать развитию инфекции. 3. Механическое раздражение: трение, травмы или раздражение из-за тесного нижнего белья. 4. Аллергические реакции: на мыло, моющие средства, латекс (презервативы). 5. Системные заболевания: диабет, псориаз, аллергические дерматозы. Вам надо сделать: 1. Общий анализ крови и мочи: для выявления системных инфекций и других заболеваний. 2. Соскоб из уретры на ЗППП методом ПЦР. Пока диагноз не поставлен Вам можно сделать следующее: 1. Гигиена: - Регулярное и тщательное мытье полового члена теплой водой без использования мыла или с применением мягких гипоаллергенных средств. - Избегать использования агрессивных химических средств для интимной гигиены. 2. Избегать раздражителей: - Носить свободное, хлопковое нижнее белье. - Избегать применения ароматизированных средств и презервативов из латекса (при подозрении на аллергию). 3. Баланекс: - Применение крем баланекс 2 раза в день 7-10 дней на головку полового члена. 4. Избегание половых контактов: до выяснения причины воспаления, чтобы избежать передачи возможной инфекции. Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо срочно обратиться к урологу для получения точного диагноза и проведения лечения.