

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Данил

**Возраст:** 23

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.06.2024 11:10:51

**формирования заключения врача:** 20.06.2024 12:38:05

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316172/answer/316173>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение. 1. Жалобы: Пациент жалуется на резь и боль в области уретры, возникающие при наполнении мочевого пузыря. Ощущение присутствия мочи в уретре до начала мочеиспускания. Боль и дискомфорт проходят после мочеиспускания. 2. Анамнез заболевания: - Проблема присутствует с детства. 3. Анамнез жизни: - Данные о значимых событиях, влияющих на здоровье, не предоставлены. 4. Интерпретация представленных данных: На основании описанных симптомов можно предположить наличие нижеследующих состояний: - Хронический уретрит: воспаление уретры, вызывающее боль и дискомфорт. - Цистит: воспаление мочевого пузыря, часто сопровождающееся болями и резью при мочеиспускании. - Гиперактивный мочевой пузырь: вызывает частые и срочные позывы на мочеиспускание, которые могут сопровождаться дискомфортом. - Стриктура уретры (сужение): может вызывать ощущение неполного опорожнения или присутствия мочи в уретре. 5. Заключение: Вероятные причины Ваших симптомов могут включать гиперактивный мочевой пузырь. Для точной диагностики потребуется дополнительное обследование. 6. Рекомендации: 1. Обратиться к очный прим к урологу для проведения следующих исследований: - Общий анализ мочи (ОАМ) - Бактериологическое исследование мочи (посев) - УЗИ органов мочевыводящей системы, включая определение объема остаточной мочи - Урофлоуметрия (измерение потока мочи) - Заполнить дневник мочеиспускания в течение 3-х суток. 2. Избегать раздражающих веществ: кофеин, алкоголь, острые и кислые продукты могут ухудшать симптомы. 3. Поддерживать адекватный питьевой режим, чтобы уменьшить концентрацию мочи и раздражение уретры. 4. Обсудить результаты обследований с врачом для определения дальнейшей тактики лечения.