

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Иван

**Возраст:** 24

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.06.2024 19:18:57

**формирования заключения врача:** 27.06.2024 09:48:17

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316222/answer/316228>



## Заключение врача

Ваше описание состояния крайней плоти и головки полового члена может указывать на частичное сужение крайней плоти. В норме, при эрекции, головка полового члена должна свободно оголяться. Если этого не происходит или если крайняя плоть возвращается на место и закрывает головку даже при эрекции, это может вызвать дискомфорт и проблемы при использовании презервативов. Важно учитывать несколько моментов: 1. Фимоз: Это состояние, при котором крайняя плоть слишком узка, чтобы свободно оголять головку полового члена. Может быть врожденным или приобретенным. 2. Относительный фимоз: Частичное сужение, при котором крайняя плоть может оголять головку в спокойном состоянии, но при эрекции головка частично закрыта. 3. Особенность анатомия: У некоторых мужчин может быть физиологическая особенность, при которой крайняя плоть остается частично закрытой даже при эрекции, но это не должно вызывать дискомфорт или мешать нормальной сексуальной активности. Чтобы точно определить причину вашего состояния, рекомендуется обратиться на очный приеме к урологу. Врач проведет осмотр и сможет более точно ответить на Ваш вопрос. Также Вы можете прислать фото полового члена в состоянии эрекции с закрытой и открытой головкой. Проблемы с использованием презервативов также могут быть решены с помощью выбора более подходящего типа или размера презерватива.