

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Денис

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.06.2024 01:55:16

формирования заключения врача: 27.06.2024 11:07:30

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316224/answer/316230>



Заключение врача

Варикоцеле классифицируется на три основные стадии в зависимости от выраженности расширения вен гроздьевидного сплетения и клинических симптомов: 1. Первая стадия (I стадия): - Варикоцеле не визуализируется и не пальпируется в состоянии покоя. - Расширенные вены могут быть обнаружены только при выполнении пробы Вальсальвы (напряжение мышц брюшного пресса при задержке дыхания). - Часто бессимптомная или с минимальными симптомами. 2. Вторая стадия (II стадия): - Варикоцеле не видно, но вены пальпируются при нормальном положении пациента, без выполнения пробы Вальсальвы. - Пациент может испытывать чувство тяжести или дискомфорта в мошонке, особенно после физической активности или длительного стояния. - Расширение вен гроздьевидного сплетения может быть более выраженным. 3. Третья стадия (III стадия): - Варикоцеле хорошо видно при осмотре и пальпируется в состоянии покоя. - Вены гроздьевидного сплетения значительно расширены и могут быть видны через кожу мошонки. - Пациент часто жалуется на боли в мошонке, чувство тяжести и дискомфорт. Возможны жалобы на нарушение фертильности.

Ваша текущая информация указывает на варикоцеле, возможно, второй или третьей стадии. Но точно ответить на Ваш вопрос я не могу - у меня нет информации по осмотру. А она важна при установлении стадии заболевания. Стоит обратить внимание на 2 вопроса: А. Показания для хирургического вмешательства при варикоцеле включают: 1. Боль в мошонке: Хроническая боль или дискомфорт в мошонке, которые не поддаются консервативному лечению и значительно влияют на качество жизни пациента. 2. Нарушение фертильности: Нарушение параметров спермограммы (снижение концентрации, подвижности или морфологии сперматозоидов), которое предполагается быть связано с варикоцеле. 3. Атрофия яичка: Значительное уменьшение размеров пораженного яичка (атрофия) по сравнению со здоровым яичком. Прогрессирующая атрофия яичка. Б. Указано, что Вы жалуетесь на "рези при мочеиспускании и боли в мошонке". Боли в мошонке могут быть связаны с варикоцеле, а рези при мочеиспускании - не характерный признак варикоцеле. Обсудите с урологом эти два важных вопроса.