

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.06.2024 15:53:52

формирования заключения врача: 01.07.2024 10:48:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316237/answer/316247>



Заключение врача

Интерпретация представленных данных: На основании описанных симптомов можно предположить несколько возможных причин: 1. Травма или микротравма - возможно наличие микротравмы полового члена, которая проявляется при физической нагрузке. 2. Фиброзный участок - наличие участка фиброзной ткани, который может вызывать болезненные ощущения при изменении кровотока или натяжении тканей. 3. Мышечный спазм - возможен локальный спазм мышц, связанный с нагрузкой. Заключение: Описанные симптомы могут быть связаны с механической травмой, наличием фиброзного участка или мышечным спазмом. Необходимы дополнительные данные для более точной диагностики, такие как визуальный осмотр и ультразвуковое исследование. Рекомендации: 1. Физический осмотр - провести осмотр урологом для оценки состояния полового члена. 2. УЗИ полового члена - для исключения структурных изменений и наличия фиброзных участков. 3. Ограничение физической нагрузки - временно снизить интенсивность физических упражнений, особенно тех, которые провоцируют боль. Если боль сохраняется или усиливается, рекомендуется очная консультация с урологом для более детального обследования и определения дальнейшей тактики лечения.