

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.07.2024 00:02:52

формирования заключения врача: 01.07.2024 11:36:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316242/answer/316252>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на боли в головке полового члена, периодическое покраснение, темные выделения, которые при засыхании покрываются коркой и легко снимаются. Анамнез заболевания В апреле 2024 года пациент проходил лечение простатита. В ходе лечения было назначено: - Массаж простаты - Лекарственная терапия - Система и инстилляции с лекарственным препаратом молочного цвета (со слов пациента, "болтушка"). Пациент прошел 6 сеансов инстилляции. До обращения с текущими жалобами, пациент сдал анализы ПЦР на 6 типов ЗППП — результаты отрицательные. Также анализы крови и мочи были в норме. Интерпретация предоставленных данных Инстилляции в уретру могут иногда приводить к раздражению слизистой оболочки уретры, что может вызывать дискомфорт, покраснение и выделения. Длительное раздражение слизистой оболочки может приводить к воспалительным реакциям, что проявляется в виде покраснения и выделений. Но могут быть и другие причины (важно!). Заключение Симптомы, такие как боль в головке полового члена, покраснение и выделения, могут быть связаны с раздражением слизистой оболочки уретры после инстилляций. Несмотря на отсутствие инфекций, выявленных ПЦР, возможны неспецифические воспалительные реакции. Также возможно, что введенное лекарство вызвало аллергическую или раздражающую реакцию.

Рекомендации

1. Консультация уролога: Рекомендуются очно обратиться к урологу для оценки текущего состояния и возможной коррекции лечения.
2. Провести микроскопию выделений.
3. Обследование на микрофлору уретры: Рекомендовано провести бактериологический посев выделений из уретры для определения микрофлоры и возможной чувствительности к антибиотикам.
4. Гигиена: Поддерживать хорошую гигиену половых органов, избегать использования агрессивных моющих средств.
5. Избегание раздражающих факторов: Избегать раздражающих факторов, таких как частые половые акты или использование презервативов с агрессивными смазками.