

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Данил

**Возраст:** 24

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.07.2024 11:19:25

**формирования заключения врача:** 04.07.2024 08:47:06

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316272/answer/316280>



## Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение.

1. Жалобы: Пациент жалуется на искривление полового органа в левую сторону на угол около 27 градусов. Отмечает наличие уплотнения в средней части полового члена.
2. Анамнез заболевания: Время возникновения жалоб не указано. УЗИ исследование проводилось, бляшек не обнаружено.
3. Интерпретация предоставленных данных: Искривление полового члена может быть связано с несколькими факторами, включая фиброзные изменения в кавернозных телах. Уплотнение, которое вы описываете, может быть связано с локализованным фиброзом, который может не визуализироваться как бляшка на УЗИ. Это состояние известно как болезнь Пейрони. Также причиной может быть врожденное искривление полового члена.
4. Заключение: На основании описанных симптомов и данных УЗИ, вероятнее всего, у пациента наблюдаются фиброзные изменения в кавернозных телах полового члена, что приводит к его искривлению. Болезнь Пейрони часто характеризуется наличием таких симптомов, даже если бляшки не визуализируются на УЗИ.
6. Рекомендации:
  - Дальнейшее обследование: Рекомендую провести дополнительное обследование, включая МРТ полового члена, для более детальной оценки состояния тканей.
  - Консультация специалиста: Проконсультируйтесь с урологом, специализирующимся на заболевании Пейрони, для определения дальнейшей тактики лечения.
  - Лечение: В зависимости от степени искривления и выраженности симптомов, могут быть предложены различные варианты лечения, такие как медикаментозная терапия (например, препарат пейрофлекс), инъекции в уплотнение, в редких случаях хирургическое вмешательство. Важно обсуждать все варианты с Вашим лечащим врачом-урологом.
  - Общий совет: Следите за изменениями в состоянии полового члена и незамедлительно сообщайте врачу о любых новых симптомах.