

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юра

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.07.2024 22:23:59

формирования заключения врача: 05.07.2024 08:57:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316291/answer/316292>



Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на ощущение припухлости под головкой полового члена, которое продолжается около недели. Отмечает, что боли и гнойных выделений нет. Анамнез заболевания Пациент отметил появление припухлости под головкой полового члена примерно неделю назад. Других симптомов, таких как боль или выделения, не наблюдалось. Ранее подобных эпизодов не было. Анамнез жизни Значимых событий, связанных со здоровьем, вне текущей жалобы не указано. Интерпретация предоставленных данных При осмотре на фотографиях наблюдается легкая припухлость под головкой полового члена. На данный момент это состояние не вызывает значительной боли или выделений, что снижает вероятность острых воспалительных процессов. 1. Фимоз — маловероятен, так как крайняя плоть свободно отодвигается, и головка полностью открыта. 2. Парафимоз — также маловероятен, так как нет признаков ущемления или резкой боли. Возможная причина припухлости могут включать: • Местный отек вследствие механического раздражения или незначительной травмы. Заключение Исходя из предоставленных данных и фотографий, нет оснований полагать, что данное состояние связано с фимозом или парафимозом. Припухлость, скорее всего, вызвана местным отеком, который может быть связан с незначительной травмой или воспалением. Рекомендации 1. Наблюдение: Продолжайте наблюдать за состоянием. Если припухлость не проходит в течение следующей недели или появляются новые симптомы (боль, выделения, затрудненное мочеиспускание), обратитесь за очной консультацией к урологу. 2. Гигиена: Обеспечьте тщательную гигиену полового члена, чтобы избежать возможного инфицирования. 3. Избегайте механического раздражения: Воздержитесь от половых актов и других действий, которые могут травмировать область, до полного выздоровления. 4. При необходимости: Если симптомы ухудшаются, возможно потребуются антибактериальная терапия или другие лечебные мероприятия после очной консультации.