

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 35

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.07.2024 09:58:58

**формирования заключения врача:** 15.07.2024 09:10:59

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316367/answer/316372>



## Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациентка жалуется на бактериальную инфекцию, для лечения которой был назначен амбулаторный режим с применением «капельниц» раствора амикацина. Анамнез заболевания: Пациентка была осмотрена и назначено лечение, включающее «капельницы» (внутривенное введение) с раствором амикацина (1000 мг + NaCl 0,9% 250 мл в/в капельно, №7) и прием левофлоксацина (500 мг по 1 т 2 раза в сутки 7 дней, далее по 1 т 1 раз в сутки). Кроме того, рекомендован прием препарата Цистон по 1 т 3 раза в сутки в течение 1 месяца. Анамнез жизни: Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано. Интерпретация представленных данных: Лабораторные анализы показывают отклонения в параметрах крови и мочи, что подтверждает наличие бактериальной инфекции. Высокий уровень лейкоцитов и других воспалительных маркеров указывает на текущий воспалительный процесс. Заключение: У пациентки диагностирована бактериальная инфекция (мочевой системы), требующая антибактериальной терапии. Было назначено внутривенное введение амикацина. Рекомендации: • Внутримышечное введение амикацина: Внутримышечное введение амикацина возможно, но эффективность и скорость действия могут отличаться от внутривенного введения. Внутривенное введение обычно предпочитается в тяжелых случаях или при необходимости быстрого достижения высокой концентрации препарата в крови. • Продолжение текущей терапии: Рекомендуется продолжить назначенное лечение и следовать предписаниям врача. Если имеются трудности с внутривенным введением, необходимо обсудить это с лечащим врачом для корректировки плана лечения. Примечание: Все изменения в лечении должны быть согласованы с лечащим врачом.