

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Артем

**Возраст:** 19

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.07.2024 10:47:10

**формирования заключения врача:** 15.07.2024 09:14:12

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316368/answer/316373>



## Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент сообщает об отсутствии чувствительности в половом члене во время полового акта и орального секса. Отмечает необходимость фантазировать для достижения оргазма. Указывает на частую мастурбацию в прошлом. Анамнез заболевания Пациенту 19 лет, первые сексуальные контакты произошли недавно. Ранее обращался к урологам, которые не выявили патологий. Анамнез жизни Значимых событий, напрямую не связанных с основной урологической проблемой, не указано. Интерпретация предоставленных данных Отсутствие чувствительности в половом члене во время полового акта и орального секса может быть связано с различными причинами, включая психологические факторы, такие как тревожность или стресс, а также возможное влияние частой мастурбации в прошлом. Частая мастурбация не обязательно ведет к проблемам с чувствительностью, но может влиять на восприятие сексуальных стимулов. Заключение Отсутствие чувствительности в половом члене при сексуальной активности может быть связано как с психологическими, так и с физиологическими факторами. Наличие нормальных результатов обследования урологом указывает на отсутствие явных анатомических или физиологических проблем. Рекомендации 1. Психологическая поддержка: - Рассмотрите возможность консультации с психологом или сексологом для обсуждения возможных психологических причин и стратегий их преодоления. 2. Партнерская коммуникация: - Обсудите свои переживания и ощущения с партнером. Совместное понимание проблемы может уменьшить тревожность и улучшить эмоциональную связь. 3. Избегание частой мастурбации: - Попробуйте уменьшить частоту мастурбации и сосредоточиться на сексуальных контактах с партнером. 4. Физиотерапия и упражнения: - Выполняйте упражнения для улучшения кровообращения в области таза, такие как упражнения Кегеля. 5. Регулярное наблюдение: - Важно продолжать регулярные визиты к урологу для мониторинга состояния и выявления любых изменений.