

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Виктория

**Возраст:** 37

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.07.2024 18:13:46

**формирования заключения врача:** 15.07.2024 09:41:42

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316370/answer/316375>



## Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациентка жалуется на наличие наружной кисты уретры размером 16x13x10 мм у входа во влагалище. Анамнез заболевания: Обратилась с жалобами на боль в пояснице, кровянистые выделения и нарушение цикла. Проведено МРТ малого таза 13 июля 2024 года. По результатам исследования выявлены кисты Наботова и парауретральная киста. Анамнез жизни: Значимых событий, влияющих на основное урологическое состояние, не сообщается. Интерпретация представленных данных: На МРТ малого таза выявлена наружная парауретральная киста размером 16x13x10 мм у входа во влагалище. Также присутствуют «кисты Наботова» на шейке матки размером 5-7 мм. Остальные органы малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь) без патологических изменений. Заключение: Обнаруженная парауретральная киста размером 16x13x10 мм может вызывать дискомфорт или боль, а также представлять риск для инфекции или обструкции мочеиспускательного канала. Рекомендации: 1. Очная консультация уролога: Необходимо очно (после осмотра на кресле) обсудить с урологом возможность хирургического удаления кисты. Показания к операции включают: а) Постоянные или сильные симптомы (боль, дискомфорт). б) Риск инфицирования. в) Увеличение кисты в размере. 2. Также стоит выполнить урофлоуметрию для оценки нарушений мочеиспускания с определением объема восточной мочи по данным УЗИ мочевого пузыря. 2. Мониторинг: Если симптомы минимальны и киста не увеличивается, может быть предложено наблюдение с регулярными контрольными осмотрами. 3. Гигиена: Поддерживайте хорошую личную гигиену для предотвращения инфекции. 4. Дополнительные обследования: Если возникают дополнительные симптомы (изменение мочеиспускания, боль), возможно потребуются дополнительные обследования.