

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2024 17:56:51

формирования заключения врача: 22.07.2024 09:17:12

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316401/answer/316410>



Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Отек и зуд головки полового члена. Анамнез заболевания: Впервые данные симптомы появились после полового акта. Сообщается о значительном отеке тканей вокруг головки полового члена и зуде в этой области. Анамнез жизни: Вы не упомянули о других значимых событиях в Вашей истории жизни, таких как хронические заболевания, аллергии или недавние медицинские вмешательства. Если есть что-то подобное, пожалуйста, сообщите. Интерпретация представленных данных: Исходя из Вашего описания, можно предположить несколько возможных причин Вашего состояния: 1. Аллергическая реакция: Возможно, Вы использовали новый презерватив, смазку или другой продукт, который мог вызвать аллергическую реакцию. 2. Механическое раздражение: Трение во время полового акта могло привести к раздражению и отеку. 3. Инфекционные причины: Бактериальные или грибковые инфекции, такие как баланопостит, могут вызвать подобные симптомы. 4. Травма: Незначительные травмы во время полового акта могут также привести к отеку и зуду. Заключение: Наиболее вероятной причиной Ваших симптомов может быть аллергическая реакция или механическое раздражение. Однако нельзя исключать инфекционные причины или травму без дополнительного обследования. Рекомендации: 1. Тщательно промойте область головки полового члена тёплой водой без мыла и смазок. 2. Не используйте презервативы или смазки, которые вы могли использовать в последнее время. 3. Возможно использование крема баланекс 2 раза в день 7-10 дней. 4. Если симптомы сохраняются или усиливаются в течение 24-48 часов, обязательно посетите врача-уролога для более детального осмотра и возможного назначения дополнительных анализов или лечения. 5. Обсудите ситуацию с половым партнёром, чтобы исключить возможность передачи инфекции и предотвратить подобные ситуации в будущем. Если будет необходимость, предоставьте дополнительную информацию или изображения, чтобы более точно определить причину Ваших симптомов.