

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вадим

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.07.2024 21:23:32

формирования заключения врача: 23.07.2024 08:41:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316415/answer/316419>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациент жалуется на увеличение правого яичка и тянущую боль в этой области. Отмечает, что правое яичко расположено ниже левого на половину. Анамнез заболевания: Пациент сообщает, что до возникновения текущих симптомов был эпизод сильного перевозбуждения и длительного воздержания, который завершился эякуляцией. Сразу после этого начались вышеописанные симптомы. Анамнез жизни: Значимых событий, связанных с общим здоровьем пациента, не указано. Пациент находится в военной командировке, что может влиять на доступ к медицинской помощи. Интерпретация предоставленных данных: Увеличение яичка и тянущая боль могут указывать на несколько различных состояний, включая:

- Эпидидимит: Воспаление яичка и/или его придатка, часто вызванное инфекцией.
- Варикоцеле: Расширение вен семенного канатика, что может вызывать ощущение тяжести и боль.
- Гидроцеле: Скопление жидкости в оболочках яичка.
- Травма: Вследствие механического воздействия или интенсивного сексуального возбуждения.

Заключение: На основании предоставленных данных, вероятной причиной симптомов является воспалительный процесс, травма или гидроцеле. Однако для точного диагноза необходимы дополнительные данные. Рекомендации:

1. Консультация врача: При первой возможности следует обратиться к урологу для очного осмотра и ультразвукового исследования мошонки, что позволит точнее определить причину симптомов.
2. Применение холодного компресса: Для уменьшения отека и боли можно применять холодный компресс на область яичка.
3. Избегание физических нагрузок: Ограничьте физическую активность, особенно поднятие тяжестей и интенсивные физические упражнения.
4. Нижнее белье: Носите поддерживающее нижнее белье для уменьшения дискомфорта.
5. Гигиена: Следите за гигиеной половых органов и избегайте потенциальных источников инфекции.

Для дальнейшей консультации и оценки состояния, Вы можете связаться со мной через предоставленные контактные данные на сайте, записаться на прием (я принимаю в Москве, это может быть для Вас не удобно) или продолжить общаться в режиме переписки. Однако, без осмотра и УЗИ органов мошонки, к сожалению, реально помочь я Вам не смогу. В случае усиления симптомов или появления новых признаков (например, лихорадки, сильной боли), рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью.