

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.07.2024 00:06:31

формирования заключения врача: 01.08.2024 08:36:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316459/answer/316463>



Заключение врача

Я изучил представленными данные. Ниже мое заключение. Жалобы: Пациент жалуется на твердость полового члена в покое, который размягчается при полном мочевом пузыре и во время мочеиспускания. Анамнез заболевания: Проблема отмечается недавно, изменения в плотности полового члена происходят в зависимости от наполненности мочевого пузыря и во время мочеиспускания. Анамнез жизни: Пациент не указывает на значимые события, связанные с его общим состоянием здоровья, не относящиеся к данной проблеме.

Интерпретация представленных данных: По описанию пациента, твердость полового члена в покое с размягчением при полном мочевом пузыре и во время мочеиспускания может являться нормальным физиологическим состоянием. Это состояние не связано с нарушениями кровообращения или простатитом. Половой член может изменять свою твердость в зависимости от различных факторов, включая физиологические изменения в организме.

Заключение: На основе представленной информации, данное состояние с большой вероятностью является нормальным и не требует лечения. Симптомы, описанные пациентом, не свидетельствуют о наличии простатита или нарушений кровообращения. Рекомендации: 1. Пациенту рекомендуется продолжать наблюдение за своим состоянием и при отсутствии других симптомов не беспокоиться. 2. Если появятся новые симптомы или изменения состояния, такие как боль, дискомфорт или проблемы с мочеиспусканием, пациенту следует обратиться к урологу для дальнейшего обследования. 3. Поддержание общего здоровья: регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточное потребление жидкости. Если будут возникать дополнительные вопросы или симптомы, рекомендуется повторная консультация с врачом.