

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Фаррух

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.08.2024 15:22:38

формирования заключения врача: 02.08.2024 08:31:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316467/answer/316471>



Заключение врача

Я изучил представленными данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на дискомфорт в области наружного отверстия полового члена, который продолжается уже полгода. Отмечается сухость кожи в данной области. Дискомфорт усиливается после семяизвержения, возможны микротрещины на губках отверстия. Анамнез заболевания Полгода назад пациенту был назначен синтомициновый мазь для профилактики, после чего возникло чувство дискомфорта в области наружного отверстия полового члена. По результатам анализов инфекционных заболеваний не выявлено. Анамнез жизни Значимых событий, напрямую не связанных с основной урологической проблемой, не указано. Интерпретация представленных данных • Синтомициновая мазь: Антибиотик, который может вызывать кожные реакции, такие как раздражение, сухость и сухость кожи при длительном применении. • Микротрещины: Возможно, во время полового акта кожа подвергается механическому воздействию, что приводит к появлению микротрещин. Это может объяснять дискомфорт. Заключение Основные жалобы пациента, вероятно, связаны с использованием синтомициновой мази и возможным возникновением микротрещин. Важно исключить возможные аллергические реакции или другие дерматологические проблемы, вызванные мазью. Рекомендации 1. Отказ от синтомициновой мази: Прекратить использование мази и наблюдать за изменениями в состоянии кожи. 2. Увлажняющие средства: Использовать нейтральные увлажняющие кремы для улучшения состояния кожи (например, на основе пантенола или гипоаллергенные кремы). 3. Использовать лубриканты на водной основе во время полового акта. Цисталис гель во время полового акта 4. Консультация дерматолога и/или уролога: При сохранении симптомов или ухудшении состояния обратиться к дерматологу или урологу на очный прием для более детального обследования и подбора соответствующего лечения.