

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.08.2024 14:27:11

формирования заключения врача: 05.08.2024 15:08:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316482/answer/316484>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на жжение в уретре, которое началось после полового акта и продолжается уже около 5 дней. Внешне на головке полового члена изменений нет, цвет мочи нормальный, дискомфорта при мочеиспускании и выраженного запаха нет.

Анамнез заболевания

Пациент сообщает, что дискомфорт начался после полового акта с женой. Других половых партнеров нет. Симптомы включают жжение в уретре, которое сохраняется уже 5 дней. Внешние изменения на головке полового члена отсутствуют, моча нормального цвета, дискомфорт при мочеиспускании и выраженный запах отсутствуют.

Анамнез жизни

Пациент не сообщает о значимых событиях в анамнезе жизни, которые могли бы быть связаны с текущими симптомами.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленных данных, жжение в уретре после полового акта может быть связано с несколькими возможными причинами: 1. **Инфекции мочеполовой системы:** несмотря на отсутствие других симптомов, возможны инфекции, такие как уретрит или простатит. 2. **Механическое раздражение:** возможно, жжение вызвано механическим раздражением уретры во время полового акта. 3. **Химическое раздражение:** использование лубрикантов или других химических веществ может вызвать раздражение. 4. **Психологические факторы:** стресс и тревога могут усиливать восприятие дискомфорта.

Заключение

Симптомы пациента могут быть вызваны инфекцией мочеполовой системы, механическим или химическим раздражением, либо психологическими факторами. Для более точного диагноза необходимы дополнительные исследования.

Рекомендации

1. **Лабораторные исследования:** - Общий анализ мочи. - Мазок из уретры для микроскопического и бактериологического исследования. - Анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), включая хламидии и гонорею. 2. **Инструментальные исследования:** - УЗИ органов малого таза для исключения простатита. 3. **Общие рекомендации:** - Избегать половых контактов до получения результатов анализов. - Обсудить проблему с супругой, чтобы исключить возможные аллергические реакции на средства контрацепции или лубриканты. - Поддерживать гигиену половых органов. 4. **Психологическая поддержка:** - Обсудить возможные психологические факторы, вызывающие дискомфорт. - При необходимости, обратиться к психологу или сексологу. Если симптомы сохранятся или ухудшатся, рекомендуется обратиться за очной консультацией к урологу для более детального обследования и назначения соответствующего лечения.