

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анонимно

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.08.2024 20:20:08

формирования заключения врача: 06.08.2024 09:42:42

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316485/answer/316486>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на возможные последствия мастурбации после недавней операции на варикоцеле.

Анамнез заболевания

Пациенту была проведена операция на варикоцеле в пятницу. В понедельник, через три дня после операции, пациент занимался мастурбацией.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Мастурбация через три дня после операции на варикоцеле может вызвать определенные риски, такие как: 1. **Повышение внутрисосудистого давления** в области малого таза, что может привести к кровотечению или нарушению заживления послеоперационной раны. 2. **Усиление болевого синдрома** и дискомфорта в области операции. 3. **Риск инфицирования** послеоперационной раны при недостаточной гигиене.

Заключение

На данный момент, без дополнительных данных о состоянии послеоперационной раны и общего самочувствия пациента, сложно сделать однозначные выводы о возможных последствиях мастурбации. Однако, учитывая вышеуказанные риски, рекомендуется соблюдать осторожность.

Рекомендации

- Наблюдение за состоянием:** Внимательно следите за состоянием послеоперационной раны. Если появятся признаки воспаления, покраснения, отека или выделений, необходимо немедленно обратиться к врачу.
- Ограничение физической активности:** Воздержитесь от мастурбации и других физических нагрузок в течение как минимум одной-двух недель после операции, чтобы дать организму время на полное восстановление.
- Гигиена:** Обеспечьте тщательную гигиену области операции, чтобы предотвратить возможное инфицирование.
- Обратитесь к врачу:** Если возникнут болевые ощущения, кровотечения или другие тревожные симптомы, немедленно обратитесь к лечащему врачу.