

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анонимно

**Возраст:** 22

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.08.2024 20:20:08

**формирования заключения врача:** 06.08.2024 09:42:42

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316485/answer/316486>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на возможные последствия мастурбации после недавней операции на варикоцеле.

## Анамнез заболевания

Пациенту была проведена операция на варикоцеле в пятницу. В понедельник, через три дня после операции, пациент занимался мастурбацией.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Мастурбация через три дня после операции на варикоцеле может вызвать определенные риски, такие как: 1. **Повышение внутрисосудистого давления** в области малого таза, что может привести к кровотечению или нарушению заживления послеоперационной раны. 2. **Усиление болевого синдрома** и дискомфорта в области операции. 3. **Риск инфицирования** послеоперационной раны при недостаточной гигиене.

## Заключение

На данный момент, без дополнительных данных о состоянии послеоперационной раны и общего самочувствия пациента, сложно сделать однозначные выводы о возможных последствиях мастурбации. Однако, учитывая вышеуказанные риски, рекомендуется соблюдать осторожность.

## Рекомендации

1. **Наблюдение за состоянием:** Внимательно следите за состоянием послеоперационной раны. Если появятся признаки воспаления, покраснения, отека или выделений, необходимо немедленно обратиться к врачу. 2. **Ограничение физической активности:** Воздержитесь от мастурбации и других физических нагрузок в течение как минимум одной-двух недель после операции, чтобы дать организму время на полное восстановление. 3. **Гигиена:** Обеспечьте тщательную гигиену области операции, чтобы предотвратить возможное инфицирование. 4. **Обратитесь к врачу:** Если возникнут болевые ощущения, кровотечения или другие тревожные симптомы, немедленно обратитесь к лечащему врачу.