

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Кирилл

**Возраст:** 44

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.08.2024 05:44:36

**формирования заключения врача:** 09.08.2024 10:24:22

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316492/answer/316493>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на отсутствие спермы (аспермию) в течение месяца после приема препарата Омник.

## Анамнез заболевания

Пациент начал прием Омника (тамсулозин) для лечения симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. После начала приема препарата заметил отсутствие эякуляции. Проблема сохраняется уже в течение месяца.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Омник (тамсулозин) является альфа-адреноблокатором, который часто используется для лечения симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Одним из известных побочных эффектов этого препарата является ретроградная эякуляция, при которой сперма попадает в мочевой пузырь вместо выхода через уретру. Это состояние не является опасным, но может вызывать беспокойство у пациентов.

## Заключение

Отсутствие спермы (аспермия) у пациента, вероятно, связано с побочным эффектом приема Омника, что привело к ретроградной эякуляции. Это состояние не опасно, но может вызывать дискомфорт и беспокойство.

## Рекомендации

- 1. Продолжить прием Омника:** Если препарат эффективно снимает симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы и отсутствие эякуляции не вызывает значительного дискомфорта, можно продолжить прием.
- 2. Обсудить альтернативные варианты лечения:** Если аспермия вызывает значительное беспокойство, обсудите с лечащим врачом возможность изменения терапии. Существуют другие препараты и методы лечения, которые могут быть менее склонны вызывать ретроградную эякуляцию.

**3. Обратиться к специалисту:** Если проблема сохраняется или вызывает значительное беспокойство, рекомендуется обратиться к лечащему урологу для проведения очной консультации и возможной коррекции лечения.