

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артём

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.08.2024 17:44:56

формирования заключения врача: 12.08.2024 08:47:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316495/answer/316500>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на неэстетичный вид после операции по обрезанию крайней плоти, проведенной накануне. Пациент обеспокоен состоянием шва и внешним видом после снятия бинта.

Анамнез заболевания

1. Операция по обрезанию крайней плоти проведена 9 августа 2024 года.
2. Операция прошла без осложнений.
3. На следующее утро после операции пациент снял бинт и обнаружил, что внешний вид шва вызывает у него беспокойство.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

На фотографиях видно состояние послеоперационного шва. Наблюдаются следующие особенности:

1. **Гиперемия (покраснение)** вокруг шва, что является нормальной реакцией на хирургическое вмешательство.
2. **Наличие корок и выделений**, что также может быть нормальной частью процесса заживления.
3. **Отек и возможные гематомы** вокруг шва, что часто встречается в первые дни после операции.

Важно отметить, что в первые дни после операции по обрезанию возможны такие симптомы, как отек, покраснение и выделения. Это нормальная часть процесса заживления, однако необходимо следить за признаками инфекции, такими как сильная боль, гнойные выделения, повышение температуры тела.

Заключение

На основании предоставленных фотографий и описания, состояние пациента после операции по обрезанию крайней плоти не вызывает серьезных опасений. Наблюдаемые изменения могут быть нормальной частью процесса заживления.

Рекомендации

- 1. Гигиена:** Продолжайте соблюдать гигиену полового органа, аккуратно промывая его теплой водой без использования агрессивных моющих средств.
- 2. Антисептики:** Используйте рекомендованные врачом антисептические средства для обработки шва.
- 3. Наблюдение:** Следите за признаками инфекции (сильная боль, гнойные выделения, повышение температуры тела). При появлении этих симптомов немедленно обратитесь к врачу.
- 4. Избегайте физической активности:** В течение первых недель после операции избегайте физической активности, которая может вызвать травму шва.
- 5. Контрольный осмотр:** Рекомендуется пройти контрольный осмотр у оперировавшего врача через 7-10 дней после операции для оценки процесса заживления.