

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марсель

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.08.2024 18:05:50

формирования заключения врача: 15.08.2024 08:28:32

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316518/answer/316519>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на появление морщин на головке полового члена спустя месяц после разрыва презерватива во время полового акта. Морщины исчезают при эрекции, но при ближайшем рассмотрении видны едва заметные красные крапинки. Боль и другие симптомы отсутствуют.

Анамнез заболевания

1. Половой акт с разрывом презерватива. 2. Через месяц после инцидента появились морщины на головке полового члена. 3. Морщины исчезают при эрекции, но видны красные крапинки.

Анамнез жизни

Пациент находится на вахте, что ограничивает возможность посещения врача. Другие значимые события в жизни и здоровье пациента не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленных фотографий патологических изменений не выявлено. Морщинистость кожи, в том числе на головке полового члена, является нормальным физиологическим процессом. Однако, при длительном нахождении вне дома и при снижении доступа к регулярным гигиеническим процедурам у мужчин может возникать баланопостит. **Баланопостит** — это воспаление головки полового члена и крайней плоти, которое может быть вызвано инфекцией, недостаточной гигиеной или аллергическими реакциями. Симптомы включают покраснение, отек, зуд и выделения.

Заключение

На основании предоставленных данных можно сделать следующие выводы: 1. Патологических изменений на головке полового члена не выявлено. 2. Морщинистость кожи является нормальным физиологическим процессом. 3. Возможность развития баланопостита при недостаточной гигиене.

Рекомендации

1. **Гигиена:**

- Промывайте область полового члена теплой водой дважды в день.
- Используйте мягкое мыло без агрессивных химических добавок.
- Тщательно промывайте и высушивайте область после мытья.
- Избегайте чрезмерного трения и использования агрессивных моющих средств.

2. Медикаментозное лечение:

- Можно использовать крем **Баланекс** два раза в день в течение 10-14 дней для предотвращения воспаления и поддержания здоровья кожи.

3. Обследование на ИППП:

- При первой возможности пройдите обследование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), сделав анализ соскоба уретры методом ПЦР.

4. Наблюдение:

- Следите за состоянием кожи. Если появятся дополнительные симптомы (боль, зуд, выделения), это может указывать на инфекцию, и потребуются немедленная консультация врача.