

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Эльмира

Возраст: 36

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.08.2024 16:56:00

формирования заключения врача: 19.08.2024 10:31:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316534/answer/316536>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Отеке у ребенка после обрезания, выполненного 27 июля 2024. Отек не проходит.

Анамнез заболевания

1. **27 июля 2024 года** - проведено обрезание.
2. **После операции** - наблюдается отек крайней плоти, который сохраняется до настоящего времени (18 августа 2024 года).

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация представленных данных

На предоставленных фотографиях виден отек крайней плоти без признаков нарушения трофики тканей головки полового члена и крайней плоти. Это свидетельствует о том, что питание тканей не нарушено, что является положительным признаком. Однако, для точной оценки состояния необходимо провести очный осмотр, чтобы исключить возможное нарушение оттока жидкости из-за сдавления тканей крайней плоти.

Отек после обрезания может быть временным явлением и часто проходит после соответствующего лечения.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что отек крайней плоти после обрезания может быть связан с нарушением оттока лимфатической жидкости. Однако, для подтверждения этого предположения и исключения других возможных причин необходим очный осмотр.

Рекомендации

1. **Очный осмотр** - необходимо провести очный осмотр у уролога для оценки состояния крайней плоти и головки полового члена, чтобы исключить возможное нарушение оттока жидкости.

2. Консультация с оперирующим урологом - обсудить вопрос с урологом, который проводил операцию, для получения дополнительных рекомендаций и возможных корректировок в лечении.

3. Общие рекомендации:

- Следить за гигиеной полового члена, чтобы избежать инфекционных осложнений.
- При необходимости применять холодные компрессы для уменьшения отека (по рекомендации врача).
- Избегать чрезмерного физического напряжения и травмирования области операции.