

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Антон

**Возраст:** 26

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.08.2024 19:37:04

**формирования заключения врача:** 21.08.2024 09:07:11

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316549/answer/316552>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

### Жалобы

Пациент жалуется на небольшое жжение в области уретры, ощущение воспаления половых губ, а также на эпизодическое кровотечение со спермой и дискомфорт при эрекции.

### Анамнез заболевания

Две недели назад со слов пациента "лопнул сосуд внутри уретры" после полового акта, который произошел после трехмесячного воздержания и употребления алкоголя. Пациент обратился к урологу, который провел УЗИ и не выявил никаких патологий. Уролог рекомендовал повторный половой акт через 5 дней после кровотечения. После этого пациент отметил небольшое кровотечение со спермой и ощущение жжения при эрекции.

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

### Интерпретация предоставленных данных

**1. Внешний вид уретры и половых губ:** На предоставленных фотографиях видно наружное отверстие уретры с выраженными складками слизистой оболочки, что может создавать впечатление «воспаления половых губ». Увеличенные или отечные складки слизистой в области уретры могут быть индивидуальной анатомической особенностью или следствием временного воспаления. Видимых признаков острого воспаления (выраженной гиперемии, гнойных выделений) не наблюдается. Однако наличие субъективных ощущений (жжение) требует более детальной оценки.

**2. Жжение и кровотечение:** Симптомы жжения при эрекции и незначительное кровотечение после полового акта могут быть связаны с неполным заживлением микротравмы или воспалительного процесса в уретре. Возвращение к активной половой жизни сразу после травмы могло замедлить процесс заживления.

### Заключение

Скорее всего, имеющиеся симптомы связаны с процессом заживления и восстановлением слизистой уретры после травмы. Изменения во внешнем виде уретры (воспаленные складки) могут быть как нормальной анатомической особенностью, так и следствием реактивного воспаления после микротравмы.

## Рекомендации

- 1. Повторный визит к урологу:** Рекомендуется повторно обратиться к урологу для осмотра и, при необходимости, проведения дополнительных исследований (анализы мочи, ИППП методов ПЦР).
- 2. Избегание половых актов:** Воздержитесь от половых актов до полного заживления.
- 3. Гигиена:** Поддерживайте высокую гигиену половых органов, чтобы избежать дополнительного воспаления.
- 4. Обследование на инфекции:** При повторном визите к урологу обсудите возможность обследования на инфекции, передающиеся половым путем, чтобы исключить этот фактор.

Если симптомы сохраняются или усиливаются, обязательно обратитесь за медицинской помощью.