

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Алексей

**Возраст:** 51

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.08.2024 09:42:12

**формирования заключения врача:** 21.08.2024 10:47:27

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316554/answer/316555>



## Заключение врача

**Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение**

### Жалобы

Пациент жалуется на отсутствие эрекции после второй процедуры брахитерапии предстательной железы, проведенной год назад по поводу злокачественного заболевания простаты.

### Анамнез заболевания

1. Год назад пациенту была проведена брахитерапия предстательной железы в связи с диагнозом злокачественного заболевания простаты.
2. После второй процедуры пациент отметил полное отсутствие эрекции.
3. Вопрос пациента касается возможности восстановления эректильной функции и возможных методов лечения.

### Анамнез жизни

Имеется злокачественное заболевание предстательной железы.

Требуется информация о стадии заболевания, исходном уровне ПСА и нижней точке падения ПСА (надира).

Необходимо уточнить наличие других хронических заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и пр.), которые могут влиять на эректильную функцию.

### Интерпретация предоставленных данных

Брахитерапия предстательной железы является эффективным методом лечения злокачественных опухолей, однако она может иметь побочные эффекты, включая эректильную дисфункцию. Потеря эректильной функции после брахитерапии может быть связана с повреждением нервов и сосудов, отвечающих за эрекцию. Восстановление эректильной функции возможно, но зависит от многих факторов, включая степень повреждения и общее состояние здоровья пациента.

### Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что эректильная дисфункция у пациента связана с проведенной брахитерапией. Восстановление эректильной функции возможно, но требует комплексного подхода и времени.

## Рекомендации

1. **Консультация с урологом-андрологом:** Рекомендуется обратиться к специалисту для детального обследования и определения степени повреждения.

2. **Дополнительные исследования:**

1. **Фармакодуплерография:**

- **Цель:** Оценка кровотока в сосудах полового члена для определения сосудистых причин эректильной дисфункции.
- **Процедура:** Введение вазоактивного препарата в кавернозные тела полового члена с последующим ультразвуковым исследованием для оценки кровотока.

2. **Гормональные исследования:**

- **Тестостерон:** Оценка уровня общего и свободного тестостерона для выявления возможного гипогонадизма.
- **ЛГ (лютеинизирующий гормон) и ФСГ (фолликулостимулирующий гормон):** Оценка гипофизарной функции и выявление возможных нарушений в регуляции гормонального фона.
- **ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны):** Оценка уровня ГСПГ для более точного определения свободного тестостерона.

3. **Контроль ПСА (простатспецифического антигена):**

- **Цель:** Мониторинг состояния предстательной железы после проведенной брахитерапии для оценки риска рецидива злокачественного процесса.

3. **Лечение:**

- **Медикаментозная терапия:** Ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (например, силденафил, тадалафил) могут быть эффективны для восстановления эректильной функции.
- **Психотерапия:** Психологическая поддержка и консультации могут помочь справиться с эмоциональными аспектами эректильной дисфункции.
- **Физиотерапия:** Вакуумные эректильные устройства и другие методы физиотерапии могут быть полезны.

4. **Образ жизни:**

- Поддержание здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.
- Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя.

5. **Коммуникация с партнером:** Открытое обсуждение проблемы с партнером может помочь в улучшении эмоционального состояния и поддержке в процессе лечения.

Пациенту рекомендуется продолжить наблюдение у лечащего врача и следовать указанным рекомендациям для достижения наилучших результатов в восстановлении эректильной функции.