

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 79

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2024 14:04:16

формирования заключения врача: 22.08.2024 15:36:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316562/answer/316563>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на **небольшое покраснение и грязноватые выделения** вокруг цистостомической трубки. Также интересуется необходимостью промывания мочевого пузыря и дренажной трубки фурацилином, а также возможностью использования Банеоцина. Вопрос о необходимости операции после УЗИ предстательной железы с заключением: **эхо-признаки увеличения размеров и неоднородности структуры предстательной железы, ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной железы)**.

Анамнез заболевания

Пациенту была проведена операция цистостомии из-за обтурации шейки мочевого пузыря (со слов пациента). После операции отмечается светло-желтый цвет мочи при потреблении около трех литров жидкости в день. На УЗИ предстательной железы выявлены признаки увеличения размеров и неоднородности структуры, что указывает на доброкачественную гиперплазию предстательной железы.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

- 1. Промывание мочевого пузыря и дренажной трубки фурацилином:** Промывание цистостомической трубки не рекомендуется, так как это может привести к восходящей инфекции мочевых путей, включая пиелонефрит. Восходящая инфекция происходит из-за того, что промывание может способствовать проникновению бактерий из нижних отделов мочевыводящих путей в верхние, что увеличивает риск инфекции.
- 2. Использование Банеоцина:** Банеоцин может быть использован для обработки области вокруг цистостомической трубки при наличии покраснения и выделений, что может свидетельствовать о местной инфекции или воспалении.
- 3. УЗИ предстательной железы:** Заключение УЗИ указывает на доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ), что является распространенным состоянием у пожилых мужчин. Увеличение размеров и неоднородность структуры предстательной железы могут вызывать обструкцию мочевого пузыря и другие симптомы.

Заключение

Пациенту необходимо пройти дополнительные обследования для постановки точного диагноза и определения необходимости, вида и объема оперативного лечения. Промывание цистостомического дренажа не рекомендуется из-за риска восходящей инфекции. Область вокруг цистостомической трубки следует держать в чистоте, используя теплую воду с мылом и, при необходимости, Банеоцин.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- **ТРУЗИ простаты** для определения объема простаты.
- **Урофлоуметрия** на перекрытом цистостомическом дренаже для оценки функции мочеиспускания.
- **ПСА (простат-специфический антиген)** для исключения онкологических процессов.
- **Оценка сопутствующих заболеваний** (например, ЭКГ) для общей оценки состояния здоровья.

2. Промывание цистостомической трубки:

- Промывание фурацилином не рекомендуется из-за риска восходящей инфекции мочевых путей (пиелонефрит).
- Цистостомическую трубку следует менять по мере нарушения ее функционирования.
- Рекомендуется использовать катетер Фолея в качестве цистостомического дренажа и регулярно его менять.

3. Уход за областью цистостомического дренажа:

- Держите область вокруг цистостомического дренажа в чистоте, промывая теплой водой с мылом не реже двух раз в сутки.
- При признаках воспаления можно использовать мази, такие как Банеоцин.
- Используйте одноразовые марлевые наклейки вокруг трубки, меняя их не реже двух раз в сутки.

4. Общий уход и профилактика:

- Поддерживайте высокий уровень гидратации (около трех литров жидкости в день).
- Следите за изменениями в цвете и запахе мочи, а также за состоянием кожи вокруг цистостомического дренажа.
- Обсуждайте любые изменения или новые симптомы с лечащим врачом.