

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лор

Возраст: 29

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.08.2024 07:54:07

формирования заключения врача: 24.08.2024 11:00:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316567/answer/316571>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на **острую боль в половом члене** во время эрекции и проникновения, а также на **кровь при мочеиспускании** после полового акта.

Анамнез заболевания

Пациент сообщает, что во время полового акта, при проникновении в партнера, почувствовал острую боль, похожую на укол иголкой, в половом члене. После завершения акта при мочеиспускании была кровь, которая затем сменилась чистой мочой.

Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, не указано. Пациент не сообщает о хронических заболеваниях или предыдущих травмах полового члена.

Интерпретация предоставленных данных

Острая боль в половом члене во время эрекции и проникновения, сопровождающаяся кровью при мочеиспускании, может указывать на **травму уретры** или **разрыв спонгиозного тела**.

Заключение

Симптомы пациента могут указывать на **травму уретры** или **разрыв спонгиозного тела**. Это состояние требует немедленного обращения к урологу.

Рекомендации

- 1. Немедленно обратиться к урологу** для проведения физического осмотра и дополнительных исследований, таких как:
 - УЗИ полового члена и органов малого таза.
 - Анализ мочи для выявления признаков инфекции или других аномалий.
- 2. Избегать половых актов** до консультации с врачом и получения рекомендаций по лечению.
- 3. Принимать обезболивающие препараты** только по назначению врача.

4. Обсудить ситуацию с партнером, чтобы избежать психологического напряжения и недопонимания.

5. Следить за общим состоянием здоровья, включая контроль за мочеиспусканием и отсутствием болевых ощущений в покое.