

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Роберт  
**Возраст:** 20  
**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич  
**Специализация:** Уролог  
**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.08.2024 22:31:07  
**формирования заключения врача:** 27.08.2024 08:04:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316585/answer/316586>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

### Жалобы

Пациент жалуется на периодический зуд, покраснение кожи и небольшое вздутие вен на половом члене.

### Анамнез заболевания

С детства у пациента был фимоз, который недавно был устранен. После этого пациент начал замечать зуд, покраснение и вздутие вен на половом члене.

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не указывает. Гигиену соблюдает.

### Интерпретация представленных данных

На предоставленных фотографиях видно покраснение кожи полового члена и небольшое вздутие вен. Это может быть связано с несколькими факторами:

- 1. Постфимозное воспаление:** После устранения фимоза кожа может быть более чувствительной и склонной к раздражению.
- 2. Механическое раздражение:** Частое трение или механическое воздействие могут вызывать покраснение и зуд.
- 3. Аллергическая реакция:** Возможна реакция на средства гигиены, презервативы или смазки.
- 4. Инфекционные причины:** Возможны бактериальные или грибковые инфекции, хотя на фотографиях явных признаков инфекции не видно.

### Заключение

Картина похожа на **баланопостит**. Баланопостит — это воспаление головки полового члена и крайней плоти, которое может быть вызвано инфекцией, аллергией или механическим раздражением. Вздутие поверхностных вен на половом члене является нормальным явлением и не требует вмешательства.

## Рекомендации

1. **Гигиена:** Продолжайте соблюдать гигиену, используя мягкие моющие средства без агрессивных химических компонентов.
2. **Избегайте механического раздражения:** Постарайтесь минимизировать трение и механическое воздействие на область полового члена.
3. **Обследование на ИППП:** Если вы живете половой жизнью, рекомендуется пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), методом ПЦР.
4. **Лечение баланопостита:** Можете использовать крем Баланекс 2 раза в день в течение 7-10 дней.
6. **Наблюдение:** Если симптомы не исчезнут в течение 1-2 недель или ухудшатся, рекомендуется обратиться к урологу для более детального осмотра.