

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Наталина

Возраст: 53

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.08.2024 09:44:58

формирования заключения врача: 27.08.2024 10:00:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316587/answer/316588>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациентка жалуется на сильную боль в пояснице. Указано, что у нее нефункционирующая почка, сахарный диабет и высокое артериальное давление.

Анамнез заболевания

Пациентка, 78 лет, с сахарным диабетом и гипертонией. Недавно было установлено, что одна из почек полностью нефункционирующая. Точная причина нефункционирования почки не указана. Боль в пояснице появилась недавно и стала интенсивной.

Анамнез жизни

Пациентка страдает сахарным диабетом и гипертонией, что требует постоянного контроля и лечения. Другие значимые события в жизни не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

- Нефункционирующая почка:** Важно уточнить, на основании каких данных было сделано заключение о нефункционирующей почке. Это может быть подтверждено результатами УЗИ, нефросцинтиграфии или других диагностических методов.
- Боль в пояснице:** Крайне редко нефункционирующая почка вызывает боль, за исключением острых состояний, таких как почечная колика, острое воспаление (пиелонефрит или пионефроз). Необходимо исключить другие причины боли в пояснице, включая проблемы с позвоночником или мышцами.
- Сахарный диабет и гипертония:** Эти состояния могут осложнять лечение и требуют тщательного контроля.

Заключение

На основании предоставленной информации, необходимо уточнить диагноз нефункционирующей почки и причины боли в пояснице. Возможные причины боли могут включать острые воспалительные процессы в почке или другие проблемы, не связанные с почкой.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Провести **УЗИ почек** для оценки состояния почек и возможных причин боли.
- Сделать **общий анализ мочи (ОАМ)** и **посев мочи** для выявления возможных инфекций.
- Определить уровень **креатинина в крови** для оценки функции почек.
- Провести **нефросцинтиграфию** для подтверждения нефункционирующей почки.

2. Контроль сахарного диабета и артериального давления:

- Регулярно измерять уровень сахара в крови и артериальное давление.
- Следовать рекомендациям эндокринолога и кардиолога по лечению и контролю этих состояний.

3. Обезболивание:

- Применение обезболивающих препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом, учитывая возможные противопоказания.

4. Консультация специалистов: -

При необходимости, проконсультироваться с нефрологом для уточнения диагноза и лечения.

- Рассмотреть возможность консультации с ортопедом или неврологом для исключения других причин боли в пояснице.

При наличии дополнительной медицинской информации и результатов обследований, можно будет принять более обоснованное клиническое решение.