

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Наталина

**Возраст:** 52

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.08.2024 09:44:58

**формирования заключения врача:** 27.08.2024 10:00:03

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316587/answer/316588>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

### Жалобы

Пациентка жалуется на сильную боль в пояснице. Указано, что у нее нефункционирующая почка, сахарный диабет и высокое артериальное давление.

### Анамнез заболевания

Пациентка, 78 лет, с сахарным диабетом и гипертонией. Недавно было установлено, что одна из почек полностью нефункционирующая. Точная причина нефункционирования почки не указана. Боль в пояснице появилась недавно и стала интенсивной.

### Анамнез жизни

Пациентка страдает сахарным диабетом и гипертонией, что требует постоянного контроля и лечения. Другие значимые события в жизни не указаны.

### Интерпретация предоставленных данных

- Нефункционирующая почка:** Важно уточнить, на основании каких данных было сделано заключение о нефункционирующей почке. Это может быть подтверждено результатами УЗИ, нефросцинтиграфии или других диагностических методов.
- Боль в пояснице:** Крайне редко нефункционирующая почка вызывает боль, за исключением острых состояний, таких как почечная колика, острое воспаление (пиелонефрит или пионефроз). Необходимо исключить другие причины боли в пояснице, включая проблемы с позвоночником или мышцами.
- Сахарный диабет и гипертония:** Эти состояния могут осложнять лечение и требуют тщательного контроля.

### Заключение

На основании предоставленной информации, необходимо уточнить диагноз нефункционирующей почки и причины боли в пояснице. Возможные причины боли могут включать острые воспалительные процессы в почке или другие проблемы, не связанные с почкой.

## Рекомендации

### 1. Дополнительные обследования:

- Провести **УЗИ почек** для оценки состояния почек и возможных причин боли.
- Сделать **общий анализ мочи (ОАМ)** и **посев мочи** для выявления возможных инфекций.
- Определить уровень **креатинина в крови** для оценки функции почек.
- Провести **нефросцинтиграфию** для подтверждения нефункционирующей почки.

### 2. Контроль сахарного диабета и артериального давления:

- Регулярно измерять уровень сахара в крови и артериальное давление.
- Следовать рекомендациям эндокринолога и кардиолога по лечению и контролю этих состояний.

### 3. Обезболивание:

- Применение обезболивающих препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом, учитывая возможные противопоказания.

### 4. Консультация специалистов: -

При необходимости, проконсультироваться с нефрологом для уточнения диагноза и лечения.

- Рассмотреть возможность консультации с ортопедом или неврологом для исключения других причин боли в пояснице.

При наличии дополнительной медицинской информации и результатов обследований, можно будет принять более обоснованное клиническое решение.