

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Михаил

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.08.2024 01:04:21

формирования заключения врача: 29.08.2024 08:52:14

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316593/answer/316597>



Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент интересуется информацией о правильном уходе за послеоперационной раной после циркумцизио и пластики уздечки, а именно на вопросы о степени тугости наматывания самофиксирующего бинта и необходимости использования стерильной салфетки.

Анамнез заболевания

Пациенту была проведена операция циркумцизио и пластика уздечки семь дней назад. Послеоперационный уход включает обработку швов бетадином 10%.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

- 1. Степень тугости бинта:** Самофиксирующий бинт должен быть намотан достаточно плотно, чтобы обеспечить фиксацию и защиту раны, но не настолько туго, чтобы вызывать дискомфорт или нарушать кровообращение. Избыточное давление может привести к отеку и замедлению заживления.
- 2. Использование стерильной салфетки:** Наложение стерильной салфетки перед бинтованием рекомендуется для дополнительной защиты раны от инфекции и для впитывания выделений. Это особенно важно в первые дни после операции, когда риск инфицирования наиболее высок.

Заключение

Пациент находится на этапе послеоперационного восстановления после циркумцизио и пластики уздечки. Вопросы касаются правильного ухода за раной, что является важным для предотвращения осложнений и ускорения заживления.

Рекомендации

1. Уход за раной:

- Продолжайте обрабатывать швы бетадином 10% два раза в день, как минимум.

- Перед наложением самофиксирующего бинта обязательно используйте стерильную салфетку для защиты раны.
- Наматывайте бинт достаточно плотно для фиксации, но не слишком туго, чтобы не нарушать кровообращение. Проверьте, чтобы бинт не вызывал дискомфорт или отек.
- При признаках заживления раны и/или формирования устойчивой корки, покрывающей раневую поверхность бинтование можно отменить и мести процесс дальнейшего заживления открыто, но этот вопрос обязательно надо согласовать с оперирующим или лечащим урологом.

2. Общие рекомендации:

- Избегайте физических нагрузок и травматизации области операции.
- Носите свободное белье, чтобы минимизировать трение и давление на рану.
- Следите за признаками инфекции (покраснение, отек, гнойные выделения) и при их появлении немедленно обратитесь к врачу.

4. Дополнительные консультации:

- Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, не стесняйтесь обратиться за повторной консультацией.