

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Даниил

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.09.2024 18:23:32

формирования заключения врача: 16.09.2024 07:51:18

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316662/answer/316665>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на периодическое жжение в области уздечки, которое возникает после мочеиспускания и иногда после мастурбации. Жжение длится 5-10 минут.

Анамнез заболевания

В детстве у пациента был фимоз, который был успешно устранен хирургом консервативным методом. В настоящее время пациент отмечает эпизодическое жжение в уздечке, но не указывает на другие симптомы, такие как выделения, боль при мочеиспускании или эрекции.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Жжение в области уздечки после мочеиспускания и мастурбации может быть связано с несколькими факторами: 1. **Хроническое воспаление (баланопостит)** - воспаление головки полового члена и крайней плоти, которое может вызывать дискомфорт и жжение. 2. **Короткая уздечка** - анатомическая особенность, которая может вызывать натяжение и раздражение при эрекции или мастурбации. 3. **Анатомические изменения после «открытие головки»** - возможные изменения тканей после устранения фимоза, которые могут вызывать дискомфорт.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить несколько возможных причин жжения в уздечке, включая хроническое воспаление, короткую уздечку или анатомические изменения после операции. Однако для точного диагноза необходим очный осмотр.

Рекомендации

1. **Очный осмотр у уролога** - для оценки состояния полового органа, исключения воспалительных процессов и анатомических особенностей.

2. **Гигиенические меры:**

- Регулярное и тщательное мытье полового органа теплой водой без использования агрессивных моющих средств.

- Избегать чрезмерного трения и раздражения уздечки.

3. **Дополнительные исследования:** - Анализ мочи для исключения инфекций мочевыводящих путей. - УЗИ половых органов для оценки анатомических изменений.

4. **Избегание самолечения** - не использовать медикаменты без назначения врача.

При необходимости, предоставьте дополнительные медицинские данные, включая фотографии проблемных областей, для более точного анализа и рекомендаций.