

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Людмила

Возраст: 47

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.09.2024 15:27:43

формирования заключения врача: 21.09.2024 11:34:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316684/answer/316686>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка сообщает о наличии белка и эритроцитов в моче. Стент в мочеточнике был установлен месяц назад, планируется его удаление.

Анамнез заболевания

Месяц назад пациентке был установлен стент в мочеточник. В настоящее время пациентка сдала анализы мочи перед планируемым удалением стента, в которых обнаружены белок и эритроциты.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Наличие белка (протеинурия) и эритроцитов (гематурия) в моче при установленном стенте в мочеточнике может быть связано с несколькими факторами:

1. **Механическое раздражение стента:** Стент может вызывать механическое раздражение слизистой оболочки мочеточника и мочевого пузыря, что приводит к появлению белка и эритроцитов в моче.
2. **Инфекция мочевыводящих путей:** Наличие стента увеличивает риск развития инфекции, что также может приводить к протеинурии и гематурии.
3. **Микротравмы:** Процедура установки стента и его присутствие могут вызвать небольшие повреждения, которые могут кровоточить и выделять белок.
4. **Инкрустация стента солями:** Со временем стент может покрываться солевыми отложениями, что также может вызывать микротравмы и появление белка и эритроцитов в моче.

Заключение

Наличие белка и эритроцитов в моче при установленном стенте в мочеточнике может быть нормальным явлением, связанным с механическим раздражением, микротравмами или инкрустацией стента солями. Однако, необходимо исключить инфекцию мочевыводящих путей.

Рекомендации

1. Мониторинг симптомов:

- Продолжайте наблюдать за состоянием, особенно за наличием других симптомов, таких как повышение температуры, боли в пояснице или ухудшение общего состояния.

2. Лабораторные исследования:

- Рекомендуется провести общий анализ мочи и посев мочи на микрофлору для исключения инфекции.

3. Обратиться к лечащему врачу:

- Обсудите с урологом результаты анализов и планируемое удаление стента. Возможно, потребуются дополнительное обследование или лечение.

4. Общие рекомендации:

- Увеличьте потребление жидкости, чтобы помочь промыть мочевыводящие пути.
- Избегайте физических нагрузок, которые могут усилить симптомы.