



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов

18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ольга

Возраст: 36

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.10.2024 11:01:37

формирования заключения врача: 09.10.2024 21:19:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316758/answer/316770>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка сообщает, что у ее супруга во время полового акта началось сильное кровотечение из полового члена. Кровь идет струей, особенно при эрекции.

Анамнез заболевания

Во время полового акта у супруга пациентки произошло кровотечение из полового члена. После вызова скорой помощи и проведения ультразвукового исследования было установлено, что произошел разрыв сосуда. В настоящее время супруг находится дома, но при эрекции кровотечение возобновляется.

Анамнез жизни

Значимые события, не связанные напрямую с урологической проблемой, не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленной информации и мнения уролога, вероятной причиной кровотечения является разрыв уздечки полового члена. Это состояние может возникнуть при интенсивной физической активности или недостаточной эластичности тканей. Разрыв уздечки может сопровождаться значительным кровотечением, особенно при эрекции, из-за повышенного кровоснабжения этой области.

Заключение

С учетом описанных симптомов и мнения уролога, наиболее вероятным диагнозом является разрыв уздечки полового члена. Это состояние требует внимания, так как повторяющееся кровотечение может привести к осложнениям.

Рекомендации

- 1. Немедленно обратиться к урологу** для осмотра и получения рекомендаций по лечению. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство для восстановления целостности уздечки.
- 2. Избегать половых контактов** до полного заживления и консультации с врачом.
- 3. Контроль за состоянием:** если кровотечение не прекращается или усиливается, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

4. Гигиенический уход: поддерживайте чистоту полового члена, чтобы предотвратить инфекцию.

5. Прием обезболивающих средств: при необходимости и после консультации с врачом, можно использовать обезболивающие препараты для уменьшения дискомфорта.

Если ситуация не улучшится или возникнут дополнительные симптомы, такие как боль или отек, необходимо срочно обратиться к специалисту.