

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Игорь

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.10.2024 10:05:36

формирования заключения врача: 20.10.2024 21:17:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316809/answer/316817>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **покраснение губок полового члена**. Отмечает, что **выделений и жжения нет**. Проблема сохраняется, несмотря на прием антибиотика ломфлокс в течение 14 дней.

Анамнез заболевания

Пациент пробовал различные методы лечения, включая курс антибиотиков, однако **симптомы не исчезли**. Все проведенные анализы не выявили отклонений от нормы.

Анамнез жизни

Пациент состоит в **моногамных отношениях** с женой. Других значительных событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не отмечает.

Интерпретация предоставленных данных

На фотографии, предоставленной урологом, видно **незначительное покраснение губок уретры**. Это может указывать на легкое воспаление или раздражение, но не обязательно связано с инфекцией. Важно исключить инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), с помощью анализа соскоба уретры методом ПЦР, включая проверку на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Заключение

На основании предоставленных данных и интерпретации уролога, вероятные причины покраснения могут быть связаны с **неинфекционными факторами**. Если результаты анализа на ИППП отрицательны и у супруги пациента отсутствуют жалобы, лечение может не потребоваться.

Рекомендации

- Провести анализ соскоба уретры на ИППП методом ПЦР**, включая проверку на ВПЧ, для исключения инфекционной природы симптомов.
- Избегать раздражающих факторов**: Исключить использование агрессивных моющих средств, лубрикантов или других химических веществ, которые могут вызывать раздражение.
- Психологическая поддержка**: Обсудите с партнером возможные психологические

факторы, которые могут влиять на состояние. Поддержка и открытое общение с партнером могут помочь в снижении стресса.

4. Наблюдение за симптомами: Вести дневник симптомов, чтобы выявить возможные триггеры или изменения в состоянии.

5. Повторная консультация: Если симптомы сохраняются или ухудшаются, рекомендуется очная консультация с урологом для более детального обследования и, возможно, проведения дополнительного обследования.