

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Даниил

**Возраст:** 22

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.10.2024 08:07:27

**формирования заключения врача:** 25.10.2024 08:55:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316845/answer/316846>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на выделения белого или желтоватого цвета из уретры, которые появляются только утром при надавливании на половой член. Выделения не имеют запаха. Также отмечается периодическое жжение в уретре.

## Анамнез заболевания

Пациент сообщает о выделениях и жжении в уретре, которые наблюдаются в течение неопределенного времени. Других симптомов, таких как боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание или изменения в общем состоянии здоровья, не отмечается.

## Анамнез жизни

Значимых событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние здоровья пациента, не указано. Важно учитывать образ жизни, наличие вредных привычек, сексуальную активность и использование средств контрацепции.

## Интерпретация предоставленных данных

Выделения из уретры и жжение могут быть связаны с несколькими состояниями, включая инфекционные процессы (например, уретрит), воспалительные заболевания или физиологические изменения, такие как скопление секрета в уретре. Отсутствие запаха и специфическое время появления симптомов могут указывать на неинфекционную природу проблемы.

## Заключение

На основании представленных данных возможно предположить наличие уретрита или другого воспалительного процесса. Однако для точного диагноза требуется дополнительная информация и обследование.

## Рекомендации

- Обратиться к врачу для проведения лабораторных исследований**, таких как анализ мочи и мазок из уретры, для исключения инфекционного процесса.
- Сделать микроскопию выделения**, чтобы определить наличие воспалительных клеток или бактерий.

3. **Провести соскоб уретры на ИППП методом ПЦР**, чтобы исключить инфекции, передающиеся половым путем.
4. **Воздержаться от половой жизни до получения результатов обследования**, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
5. **Посетить уролога или дерматовенеролога для оценки результатов обследования** и, если необходимо, назначения лечения.
6. **Избегать раздражающих факторов**, таких как агрессивные моющие средства или чрезмерное трение, которые могут усугубить симптомы.
7. **Обсудить с партнером наличие симптомов** и возможность совместного обследования, если это актуально.
8. **Поддерживать гигиену половых органов**, но избегать чрезмерного использования мыла и других химических средств.
9. **Следить за изменениями в симптомах** и при ухудшении состояния немедленно обратиться за медицинской помощью.