

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина

**Возраст:** 22

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 25.10.2024 11:45:35

**формирования заключения врача:** 27.10.2024 10:42:48

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/316847/answer/316858>



## Заключение врача

### Жалобы

Пациентка жалуется на **острые боли** в области почек, **темно-коричневую мочу** с возможными сгустками крови, **резкие боли при мочеиспускании**, а также на **повышенную температуру** после удаления стента. Также отмечает **боль в лобковой области**.

### Анамнез заболевания

1. **04.09.2024** - Установлен стент для улучшения оттока мочи из-за обструкции камнем. 2. Через месяц проведена литотрипсия (дробление камня), стент оставлен на месте. 3. **23.10.2024** - Удаление стента. До удаления пациентка испытывала острые боли и отмечала наличие крови в моче. 4. После удаления стента - сильные боли при мочеиспускании и кровь в моче, на следующий день улучшение состояния, но повышение температуры. 5. Проведены повторные анализы и УЗИ, выявлено расширение лоханки и "воспаление" (со слов пациентки).

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

### Интерпретация предоставленных данных

Удаление стента может сопровождаться временными болями и наличием крови в моче, что связано с раздражением мочевых путей. **Повышенная температура** и **воспаление** могут указывать на инфекционный процесс, который требует внимания. **Боль в лобковой области** может быть связана с раздражением мочевого пузыря или мочеиспускательного канала, но также может иметь и другие причины, которые требуют дополнительного обследования.

### Заключение

Симптомы указывают на возможное **воспаление мочевыводящих путей** после удаления стента, что может быть связано с инфекцией или механическим раздражением. **Боль в лобковой области** требует дополнительного внимания, так как она может быть связана с урологическими проблемами.

### Рекомендации

1. **Убедиться в полном восстановлении оттока мочи:**

- Провести **УЗИ почек и мочевого пузыря** для оценки состояния мочевыводящих путей.

- Выполнить **КТ почек, мочеточников и мочевого пузыря** (нативный снимок и с контрастом) для исключения обструкции.

## 2. **Исключить инфекцию мочевых путей:**

- Провести **общий анализ мочи** для выявления признаков инфекции. -

Сделать **посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам** для определения наличия бактериальной инфекции и подбора адекватной антибактериальной терапии.

3. **Обсудите с врачом** возможность временного освобождения от работы, учитывая наличие температуры и воспалительного процесса.

4. **Пейте достаточное количество жидкости** для улучшения оттока мочи и профилактики образования новых камней.

5. **Обратитесь к гинекологу**, если боль в лобковой области сохраняется, для исключения гинекологических причин.

6. **Обсудите с врачом** возможные обезболивающие средства для облегчения боли при мочеиспускании.

Важно следить за своим состоянием и при ухудшении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.