

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 54

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.10.2024 14:28:21

формирования заключения врача: 27.10.2024 10:59:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316853/answer/316861>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **ноющую боль в области правой почки, резь в основании полового члена**, которая временно проходит после мочеиспускания, а также на **гематурию** (кровь в моче), которая проявляется днем и нормализуется к вечеру и ночью. Симптомы усиливаются после поездок на автомобиле.

Анамнез заболевания

4 октября 2024 года пациенту был установлен мочеточниковый стент и удален камень из правого мочеточника. После операции был проведен курс антибиотикотерапии Цефтриаксоном, а после выписки пациент принимал антибиотик в капсулах в течение недели. В настоящее время продолжает прием Роватинекса по две капсулы три раза в день.

Анамнез жизни

Пациент проживает в дачном поселке недалеко от города. Другие значимые события здоровья не указаны.

Интерпретация представленных данных

Установка мочеточникового стента может вызывать **дискомфорт и боль**, особенно в первые дни после процедуры. **Гематурия** может быть связана с раздражением мочевых путей стентом. **Резь в основании полового члена** может быть связана с реакцией на стент или инфекцией. Усиление симптомов после физической активности, такой как поездка на автомобиле, также является распространенным явлением.

Заключение

Симптомы пациента могут быть связаны с **раздражением мочевых путей стентом**, возможной **инфекцией мочевыводящих путей**, а также необходимо исключить **неправильное положение стента**.

Рекомендации

- Продолжить прием Роватинекса** для облегчения симптомов.
- Провести УЗИ почек и мочевого пузыря** для исключения нарушения оттока мочи и проверки правильного положения стента.

3. **Сделать общий анализ мочи** для исключения инфекции мочевых путей.
4. **Обсудить результаты обследований с урологом** для корректировки лечения при необходимости. Иногда требуется крректировка стояния стента или для его удаления.
5. **Пить достаточное количество жидкости** для поддержания нормального диуреза и снижения риска инфекции.
6. **Избегать чрезмерной физической активности**, особенно поездок на автомобиле, до улучшения состояния.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.