

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 48

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.10.2024 21:07:24

формирования заключения врача: 27.10.2024 11:07:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/316854/answer/316862



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление желтого налета на головке полового члена на пятый день после обрезания.

Анамнез заболевания

Пациент перенес обрезание пять дней назад. На данный момент наблюдается желтый налет на головке полового члена.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленного фото, несмотря на его не очень хорошее качество, виден фибриновый налет, что может свидетельствовать о предшествующем длительном воспалении головки полового члена (баланопостит). Это состояние может быть связано с воспалительным процессом после обрезания, сопровождающем процесс заживления.

Заключение

Состояние может быть связано с баланопоститом, который развился вследствие длительного воспаления. Необходимо следовать назначениям лечащего уролога, чтобы избежать осложнений.

Рекомендации

1. Следование назначениям уролога: Продолжайте следовать рекомендациям вашего лечащего уролога, так как он наиболее осведомлен о вашем состоянии.

2. Местная терапия:

- **Ванночки**: Используйте слабый раствор перманганата калия (слабо розовый) или водный раствор хлоргексидина 2-3 раза в день для обработки области.
- **Мазь**: Наносите мазь Ауробин тонким слоем 2 раза в день для уменьшения воспаления и ускорения заживления.
- 3. Гигиена: Поддерживайте чистоту области хирургического вмешательства, избегая

агрессивных моющих средств.

4. **Наблюдение за симптомами**: Обратите внимание на наличие других симптомов, таких как боль, отек или покраснение. Если они усиливаются, это может потребовать медицинского вмешательства.

Если состояние ухудшится или появятся новые симптомы, настоятельно рекомендуется обратиться за очной консультацией.