

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Зилола

Возраст: 24

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.10.2024 22:44:25

формирования заключения врача: 27.10.2024 11:20:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/316856/answer/316864>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на **гематурию** (наличие крови в моче) после установки стента в мочеточник. Также выражает беспокойство по поводу отсутствия улучшений в состоянии почки при наличии гидронефроза, несмотря на установленный стент. Пациентка находится на **35-й неделе беременности**.

Анамнез заболевания

Две недели назад пациентке был установлен стент в мочеточник в связи с диагностированным гидронефрозом. После установки стента наблюдается изменение цвета мочи на красный. По данным ультразвукового исследования, изменений в состоянии почки не выявлено. Уролог считает, что наличие крови в моче является нормальным явлением после установки стента, что может быть связано со **стентассоциированными симптомами**.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано. Пациентка находится на 35-й неделе беременности, что является важным фактором при оценке состояния здоровья и выборе методов лечения.

Интерпретация предоставленных данных

Гематурия и отсутствие изменений на УЗИ могут указывать на **стентассоциированные симптомы**, которые включают механическое раздражение слизистой оболочки мочеточника. Это явление может быть временным и не всегда указывает на ухудшение состояния. Однако, учитывая беременность, важно внимательно следить за состоянием почек и общим самочувствием пациентки.

Заключение

Ситуация требует внимательного наблюдения, особенно в контексте беременности. Возможные причины гематурии включают механическое раздражение от стента или другие осложнения, которые требуют исключения.

Рекомендации

1. **Обсудить с лечащим урологом правильность положения стента** и целесообразность его нахождения в мочевыводящих путях, учитывая текущие симптомы.

2. **Продолжить наблюдение** у уролога и акушера-гинеколога для оценки состояния почек и беременности.

3. **Провести дополнительные исследования**, такие как анализ мочи и крови, для исключения инфекций или других осложнений.

4. **Поддерживать адекватный уровень гидратации**, чтобы способствовать нормальному функционированию почек.

5. **Планировать роды с учетом состояния почек**, возможно, в специализированном медицинском учреждении, где есть возможность оказания экстренной помощи.

Важно продолжать наблюдение и своевременно реагировать на изменения в состоянии здоровья, особенно в условиях беременности.