



Информационно-консультативный портал  
для урологических пациентов

18+

## Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 56

**Пол:** Мужской

Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.11.2024 18:55:26

**формирования заключения врача:** 15.11.2024 16:15:58

Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317056/answer/317064>



## Заключение врача

### Жалобы

Александр жалуется на **рецидивирующее затруднение мочеиспускания** после нескольких хирургических вмешательств, включая ТУР простаты и лазерную резекцию уретры. Симптомы временно улучшаются после процедур, но быстро возвращаются.

### Анамнез заболевания

В июле была проведена **ТУР простаты**, после чего выявлена стриктура уретры. Через месяц после операции начались проблемы с мочеиспусканием. Было проведено **бужирование** и установлен катетер Фолея на 2 недели, что временно улучшило ситуацию. В октябре проведена **лазерная резекция уретры** другим врачом, но проблема рецидивировала. Бужирование проводилось дважды, но без длительного эффекта.

### Анамнез жизни

Пациент имеет противопоказания к пластической хирургии из-за проблем со свертываемостью крови. Это ограничивает возможности для более радикальных хирургических вмешательств.

### Интерпретация предоставленных данных

Стриктура уретры является **сужением мочеиспускательного канала** вследствие рубцового поражения стенки уретры. Бужирование и лазерная резекция являются паллиативными методами, которые могут временно улучшить проходимость, но не устраняют основную проблему. Бужирование может вызывать микронадрывы, что приводит к усугублению состояния.

### Заключение

На основании предоставленных данных, у пациента наблюдаются **рецидивирующие стриктуры уретры** после хирургических вмешательств. Противопоказания к пластической хирургии усложняют лечение. Текущие методы лечения не обеспечивают длительного улучшения.

### Рекомендации

1. Уточнить локализацию и протяженность стриктуры с помощью микционной уретрограммы и обсудить результаты с урологом, который специализируется на этой проблеме.

- 2. Избегать частого бужирования**, так как это может усугубить состояние.
3. Рассмотреть **возможность оперативного лечения** стриктуры методом пластики, если это возможно в рамках медицинских показаний и финансовых возможностей.
- 4. Обсудить возможность выполнения операции** по полюсу ОМС или по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в федеральном центре.
- 5. Мониторинг состояния:** Регулярно проверяйте состояние мочеиспускания и обращайтесь за медицинской помощью при ухудшении симптомов, таких как боль или инфекция.