

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Семен

**Возраст:** 21

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.11.2024 17:18:38

**формирования заключения врача:** 20.11.2024 21:23:15

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317110/answer/317112>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на боль в половом члене после удаления мочевого катетера и интересуется, когда можно возобновить половую активность после операции трепанации черепа.

## Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию трепанации черепа. В послеоперационном периоде был установлен мочевого катетер, который впоследствии был удален. В настоящее время пациент испытывает боль в половом члене после удаления катетера.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Боль в половом члене после удаления катетера может быть связана с раздражением или микротравмами уретры, что является распространенным явлением. Обычно такие симптомы проходят в течение нескольких дней. Что касается половой активности после трепанации черепа, это зависит от общего состояния пациента и рекомендаций лечащего врача. Важно учитывать риск повышения внутричерепного давления и других осложнений.

## Заключение

Симптомы, описанные пациентом, могут быть временными и связаны с недавними медицинскими вмешательствами. Однако, учитывая недавнюю операцию на черепе, необходимо соблюдать осторожность.

## Рекомендации

- 1. Наблюдение за симптомами:** Если боль в половом члене не проходит в течение нескольких дней или усиливается, рекомендуется обратиться к урологу на очный прием.
- 2. Воздержание от половой активности:** Рекомендуется воздержаться от половой активности до получения разрешения от лечащего врача, особенно учитывая недавнюю операцию на черепе.
- 3. Общение с лечащим врачом:** Обсудите с врачом любые симптомы или беспокойства, связанные с вашим состоянием.